

GREEN LIGHT

OUTDOOR

Many Purpose Dust

Kills On Contact



Spider



Fire Ant



Scorpion

ACTIVE INGREDIENT:

Deltamethrin (S)-alpha-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

0.05%

OTHER INGREDIENTS

99.95%

TOTAL 100.00%

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION See Booklet For Additional
Precautionary Statements

MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIÓN Vea en folleto las
precauciones adicionales

Use On Vegetable Gardens

NET WT 1 LB (454g)

continúa

HORTALIZAS	PLAGAS OBJETIVO	OBSERVACIONES	Proporción de aplicación: Onzas de polvo / 9.3 metros cuadrados (100 pies cuadrados)	Máximo de aplicaciones/ temporada de cultivo
Hortalizas crucíferas: cantalupo, chayote, calabaza china, melón chino, pepino, pepinillo, calabaza, especies del género <i>Mimóridica</i> (matucana balsámica, para balsámica, melón anisado, pepino chino), melón retorcido, calabaza, zapallo, sandía	Gusano soldado, gusano hilo medidor, escarabajo de la patata de Colorado, gusano del maíz, escarabajo del pepino, gusano cortador, jojoba dorso de diamante (larva), escarabajo papa, saltamontes, dípteros verdes del durazno, oscarillos, barrenadores de hojas, gusano del medio, gusano barrenador del fruto, chichas apocetas, chichas Lygus, copaleo del tallo, gusano por el tomate, grupos de las hormigas (pudrición, copaleo accidental, mosca blanca (larva))	No aplique una cantidad mayor que la recomendada (76 gramos (0.168 lb) de polvo) en una temporada de cultivo. Deje pasar 3 días entre aplicación y aplicación. No aplique dentro de los 3 días de la cosecha.	2.13	6
Hortalizas con fruto: berenjena, uchuva, pepinos, pimientos, tomate, tomate	Afidos, gusano soldado, gusano hilo medidor, escarabajo de la patata de Colorado, escarabajo del pepino, gusano cortador, pulga dorso de diamante, barrenadores del maíz europeo, escarabajo papa, gusano del roble importado, miridos de hojas, propágulos del zorro, chichas apocetas, chichas Lygus, pulgones, gusano del tomate (gusano del maíz), gusano por el tomate, gusano cortador variegado, mosca blanca	No aplique una cantidad mayor que la recomendada (76 gramos (0.168 lb) de polvo) en una temporada de cultivo. Deje pasar 5 días entre aplicación y aplicación. No aplique a un día de la cosecha.	2.13	6
Hortalizas de raíz: zanahoria, apio, perejil (tuberoso), achicoria	Gusano soldado, gusano hilo medidor, gusano cortador, barrenadores del maíz europeo, escarabajo papa, dípteros verdes del durazno, oscarillos, chichas Lygus (chichas de plantas), grupos de las hormigas	No aplique una cantidad mayor que la recomendada (63.5 gramos (0.14 lb) de polvo) en una temporada de cultivo. Deje pasar 3 días entre aplicación y aplicación. No aplique dentro de los 3 días de la cosecha. No se deben realizar aplicaciones en hortalizas de raíz cuya parte superior u hojas se cosechen para consumo humano.	2.13	5
Hortalizas de tubérculo y raíz: papa, batata, arracacha, amarriz, alcachofa china, alcachofa de Jerusalén, coque comestible, mandioca amarilla y dulce, chayote (raíz), chita, malanga, jengibre, leleto, yautía, coroma, papa, maca	Gusano soldado, gusano hilo medidor, gusano cortador, barrenadores del maíz europeo, escarabajo papa, dípteros verdes del durazno, oscarillos, chichas Lygus (chichas de plantas), grupos de las hormigas, chichas Lygus	No aplique una cantidad mayor que la recomendada (63.5 gramos (0.14 lb) de polvo) en una temporada de cultivo. Deje pasar 3 días entre aplicación y aplicación. No aplique dentro de los 3 días de la cosecha. No se deben realizar aplicaciones en hortalizas de tubérculo o tubo cuya parte superior u hojas se cosechen para consumo humano.	2.13	5

USO PARA EL TRATAMIENTO DE FUEGO ANTO - TRATAMIENTO DE HORMIGUEROS ROJAS IMPORTADAS

Aplique Green Light Many Purpose Dust con una lata rociadora. Aplique sobre completamente en las hormigas adosadamente cubiertas y alrededor del perímetro (45 cm (18 pulg.) a partir del borde exterior del hormiguero). Si se obtiene un control completo, podrá ser necesaria una segunda aplicación. **NO PERTURBE LOS HORMIGUEROS ANTES DE LA APLICACIÓN.** De ser posible, tape todas las colonias en la vecindad. Además, tape las colonias que no han controlado hermigueros brodas. Las hormigas amarillas (las que no son de color rojo) no son controladas por este producto. **Green Light Many Purpose Dust** es un producto de Green Light Many Purpose Dust. Aplíquelo cuando la temperatura está entre 15 y 27°C (65 y 80°F). Deje pasar entre 3 y 4 días para obtener máximo control. Luego de usar para pesticidas algún insecto de control, tal como un cordero u otra tasa para medir, no se le debe usar para alimentos.

GARANTÍA

El vendedor garantiza que este producto se conforma a la descripción química en la etiqueta y es razonablemente adecuado para el propósito declarado en la etiqueta cuando es utilizado estrictamente de acuerdo a las instrucciones. A la medida aplicable en que se permite la ley, el vendedor no oprime o limita cualquier otra garantía de comerciabilidad o calidad para algún otro propósito o uso, más allá de las declaraciones mencionadas en esta etiqueta.

PULL

PRECAUTIONARY STATEMENTS**HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS**

CAUTION: May be harmful if absorbed through skin. Avoid contact with skin, eyes or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum or using tobacco.

FIRST AID

IF ON SKIN OR CLOTHING: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a poison control center or doctor for treatment advice. **IF IN EYES:** Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for treatment advice.

HOTLINE NUMBER: Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment. You may also contact **(800) 577-5702** for general information and/or medical information.

ENVIRONMENTAL HAZARDS: This product is extremely toxic to fish and aquatic invertebrates. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area.

DIRECTIONS FOR USE: It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. Not for use in commercial food/feed handling establishments, restaurants or other establishments where food/feed is commercially prepared, processed or served.

STORAGE AND DISPOSAL

PESTICIDE STORAGE: Store product in original container in a cool, dry, locked storage area out of reach of children and pets. **PESTICIDE DISPOSAL AND CONTAINER HANDLING:** Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. **If empty:** Place in trash or offer for recycling if available. **If partly filled:** Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

IMPORTANT: Read the entire Directions for Use, Precautions and Disclaimer of Warranties before using this product.

Green Light® Many Purpose Dust is a ready-to-use insecticide dust which exhibits effective knockdown and long-lasting control against the pests listed when used according to label directions. *Green Light Many Purpose Dust* can be used for long-lasting pest control in and around homes and their immediate surroundings. Permitted areas of use include: animal quarters, household greenhouses, ornamentals and vegetables. This product is intended for applications with a hand duster or from the container or by other suitable means, to hiding and runway areas and other places where insects are found.

OUTDOOR USES

ORNAMENTAL PLANT PESTS	For the control of: aphids, beet armyworms, blister beetles, boxelder bugs, certain leafminers (boxwood, holly, oak, spruce needle), elm leaf beetle, flea beetles, Japanese beetles, leafhoppers, leafrollers, orange tortrix, periodical cicada, plant bugs, rose chafer, rose slugs, tent caterpillars, thrips and weevils.
SHRUBS AND ORNAMENTALS	Apply when insects or their damage first appear and repeat at weekly intervals if necessary. Apply 8 ounces per 1,000 square feet, or thoroughly apply to place a thin layer of dust on both upper and lower sides of leaves, stems and flowers.
ROSES, PETUNIAS, CHRYSANTHEMUMS, GERANIUMS, CARNATIONS, AND OTHER RELATED FLOWERS	To control many leaf and flower chewing insects, apply as soon as the insect appears and repeat at 7 day intervals or as long as insects continue to appear. Apply a thin layer of dust on both upper and lower sides of leaves, stems and flowers.
PERIMETER TREATMENT	Use <i>Green Light Many Purpose Dust</i> as a residual treatment for control of: ants, bees, centipedes, cockroaches, crickets, firebrats, fleas, ground beetles, millipedes, scorpions, silverfish, slugs, sowbugs (pillbugs), spiders, ticks and wasps. Make a residual treatment around windows and doors, porches, screens, eaves, patios, garages, under stairways, in crawl spaces and other areas where pests hide. To help prevent the invasion of buildings and structures by these pests, apply thoroughly and uniformly to the foundation and crawl spaces where pests are active and may find entrance.

HOME VEGETABLE GARDENS: Use a dust applicator such as a shaker can, dust gun, puffer or other bulbous duster, rotary duster or other appropriate available duster. Dust lightly to cover both upper and lower leaf surfaces with a thin, even film of dust. Apply when air is calm to avoid drift and contact with eyes and skin. Start applying at the farthest corner of the treatment area and work backward to avoid contact with dusted surfaces. Allow dust to settle in treated areas before reentering.

Green Light is a registered trademark of Valent U.S.A. Corporation

EPA Reg. No. 85827-8 EPA Est. No. 39578-TX-01

Manufactured for:

Green Light, A Valent U.S.A. Company

P.O. Box 8025

Walnut Creek, CA 94596-8025 www.greenlightco.com

Form 7015-B

Tel. (800) 777-5702

85827-8.20100426

Rev. 8-23-2011



1 LB



VEGETABLES	TARGET PESTS	REMARKS	Application Rates: Ounces of Dust /100 sq ft	Max Applications/ Growing Season
Bulb Vegetables – garlic, leeks, onions, shallots	Cutworms, stink bugs, thrips	Do not apply more than recommended amount [0.112 lb ai/A] in one growing season. Allow 5 days between applications. Do not apply within one day of harvest.	2.13	4
Corn, Sweet	Aphids, armyworms, chinch bugs, click beetle, corn earworm, corn rootworm (adult), cutworms, European corn borer, flea beetles, grasshoppers, Japanese beetle (adult), June beetle (adult), masked chaffer (adult), southern corn borer, southwestern corn borer, stalk borer, stink bugs, webworms	Do not apply more than recommended amount [0.45 lb ai/A] one growing season. Do not apply within 24 hours of harvest.	2.13	16
Cucurbit Vegetables – cantaloupes, chayote, Chinese waxgourd, citron melon, cucumber, gherkin, gourds, Momordica species (balsam apple, balsam pear, bitter melon, Chinese cucumber), muskmelon, pumpkin, squash, watermelon	Armyworm, cabbage looper, Colorado potato beetle, corn earworm, cucumber beetles, cutworms, diamondback moth (larvae), flea beetles, grasshoppers, green peach aphid, leafhoppers, leafminers, melonworm, pickleworm, stink bugs, tarnished plant bug, tobacco budworm, tomato pinworm, vegetable weevil (adult), western plant bug, whitefly (adult)	Do not apply more than recommended amount [0.168 lb ai/A] in one growing season. Allow 3 days between applications. Do not apply within 3 days of harvest.	2.13	6
Fruiting Vegetables – eggplant, groundcherry, pepinos, peppers, tomatillo, tomato	Aphids, armyworm, cabbage looper, Colorado potato beetle, cucumber beetle, cutworms, diamondback moth, European corn borer, flea beetles, imported cabbageworm, leafminers, pepper weevil, stink bugs, tarnished plant bug, thrips, tomato fruitworm (corn earworm), tomato pinworm, variegated cutworm, whitefly	Do not apply more than recommended amount [0.168 lb ai/A] in one growing season. Allow 5 days between applications. Do not apply within 1 day of harvest.	2.13	6
Root Vegetables – carrot, celeriac, chervil (turnip-rooted), chicory	Armyworm, cabbage looper, Colorado potato beetle, cutworms, European corn borer, flea beetles, green peach aphid, leafhoppers, lygus bug (plant bug), pea aphid, tarnished plant bug	Do not apply more than recommended amount [0.14 lb ai/A] in one growing season. Allow 3 days between applications. Do not apply within 3 days of harvest. Other than radishes, applications may not be made to root vegetables whose tops or leaves are to be harvested for human consumption.	2.13	5

VEGETABLES	TARGET PESTS	REMARKS	Application Rate: Ounces of Dust /100 sq ft	Max Applications/ Growing Season
Tuberous & Corm Vegetables – potato, sweet potato, arracacha, arrowroot, Chinese artichoke, Jerusalem artichoke, edible canna, bitter and sweet cassava, chayote (root), chufa, dasheen, ginger, leren taro, tumeric, yam bean, true yam	Armyworm, cabbage looper, Colorado potato beetle, cutworms, European corn borer, flea beetles, green peach aphid, leathoppers, jigsaw bug (plant bug), pea aphid, Tarnished plant bug	Do not apply more than recommended amount (0.14 lb ai/A) in one growing season. Allow 3 days between applications. Do not apply within 3 days of harvest. Applications may not be made to tuberous or corm vegetables whose tops or leaves are to be harvested for human consumption.	2.13	5

USE DIRECTIONS FOR FIRE ANT TREATMENT - IMPORTED FIRE ANT MOUND TREATMENT

Apply *Green Light Many Purpose Dust* with a shaker can. Thoroughly apply dust to adequately cover mound and around the perimeter (16" from the outer edge of the mound). A second treatment may be necessary if complete control is not obtained. **DO NOT DISTURB THE MOUND PRIOR TO APPLICATION.** If possible, treat all colonies in the vicinity. Also, treat colonies which have not yet constructed a mound. Alternate Directions - Evenly sprinkle one tablespoon (approximately 10 grams) of *Green Light Many Purpose Dust* over the top of each mound. Do not water in or disturb the mound. Apply when temperatures are between 65 and 80°F. Allow 3 to 4 days for maximum control, then repeat as necessary. Do not use food utensils, such as a teaspoon or measuring cups, for food after use with pesticides.

WARRANTY

Seller warrants that this product conforms to the chemical description on the label and is reasonably fit for the purposes stated on the label when used in strict accordance with the directions. To the extent consistent with applicable law, seller makes no other expressed or implied warranty of merchantability or fitness, for a particular purpose or otherwise, that extend beyond the statements made on this label.

PRECAUCIONES

PELIGRO PARA LAS PERSONAS Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS
PRECAUCIÓN: Podría ser dañino al absorberlo la piel. Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Después de usarlo, lávese completamente con agua y jabón. Lávese a fondo con el jabón y agua después de dirigir y antes de comer, de beber, de chicle, o de usar al tabaco.

PRIMEROS AUXILIOS

SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL O LA ROPA: Quite la ropa contaminada. Enjuague inmediatamente la piel con suficiente agua por 15 a 20 minutos. Llame a un centro para control de venenos o a un médico para obtener consejo sobre tratamiento. **SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS:** Sostenga abiertos los ojos y enjuáguelos con agua lenta y suave durante 15 a 20 minutos. Después de los primeros 5 minutos quítese los lentes de contacto si los usa y continúe enjuagándose los ojos. Llame a un centro para control de venenos o a un médico para obtener consejo sobre tratamiento.
NÚMERO TELEFÓNICO PARA AYUDA: Al llamar al centro para control de venenos o a un médico, o al ir a un lugar para obtener tratamiento, tenga a la mano la etiqueta o el recipiente del producto. También puede ponerse en contacto (800) 577-5762 para obtener información general o médica.

PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE: Este producto es extremadamente tóxico para los peces e invertebrados acuáticos. No lo aplique directamente al agua. Úselo con cuidado al aplicarlo en áreas adyacentes a cualquier elemento fluvial. No contamine el agua al desachar el líquido que se ha usado para enjuagar el equipo.

INSTRUCCIONES PARA USO: El usar este producto de una manera diferente a la que se indica en la etiqueta es una violación de las leyes federales. No para el uso en alimento/a alimentación que maneja los establecimientos, restaurantes comerciales u otros establecimientos donde el alimento/los alimentos acondicionados para el comercio, procesados o servidos.

ALMACENAMIENTO Y DESECHO

ALMACENAMIENTO: Almacene el producto en el recipiente original en un lugar fresco, seco y bajo llave, fuera del alcance de los niños. **DESECHO:** Si está vacío, no vuelva a usar este recipiente. Póngalo en la basura o en la caja para reciclaje, si hay una disponible. Si está parcialmente vacío, llame a su agencia local para desperdicios sólidos para obtener instrucciones para su desecho. Nunca vierta el producto sobrante en drenajes internos ni externos.

IMPORTANTE: Antes de usar este producto, lee todas las instrucciones para su uso así como las precauciones.

Green Light Many Purpose Dust es un polvo insecticida listo para usarse que exhibe eliminación efectiva al contacto así como control residual contra las plagas listadas cuando se le usa de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta. Green Light Many Purpose Dust puede usarse para un control en y de plagas duradero sus alrededores. Entre las áreas en que se le puede usar se encuentran las siguientes: recintos de animales, viveros en casas, y ornamentales. Este producto debe usarse con un pulverizador de mano o directamente del recipiente, o por otros medios convenientes en escondrijos y lugares de tráfico y otras áreas en que se encuentran insectos.

EXTERIORES

PESTES DE PLANTAS ORNAMENTALES				
ARBUSTOS Y PLANTAS ORNAMENTALES				
ROSAS, PETUNIAS, CRISANTEMOS, GERANIOS, CLAVELES Y OTRAS PLANTAS RELACIONADAS				
TRATAMIENTO DE PERIMETROS				
HUERTAS RESIDENCIALES				
HORTALIZAS	PLAGAS OBJETIVO	OBSERVACIONES	Proporción de aplicación: Onzas de polvo / 9.3 metros cuadrados (100 pies cuadrados)	Máximo de aplicaciones/ temporada de cultivo
Hortalizas de bulbo: ajo, puerros, cebollas y chalotes	Gusanos cortadores, chinches apostonas, pulgones	No aplique una cantidad mayor que la recomendada (51 gramos [0.112 lb] de la/A) en una temporada de cultivo. Deje pasar 5 días entre aplicación y aplicación. No aplique a un día de la cosecha.	2.13	4
Maíz dulce	Ardidos, gusanos soldado, chinches, escarabajos de resorte, gusanos del maíz, gusanos de la raíz (adultos), gusanos cortadores, barrenadores del maíz europeo, escarabajos pulga, saltamontes, escarabajo japonés (adulto), escarabajo de junio (adulto), gusarajo enmascarado (adulto), barrenadores del maíz del sur, barrenadores del maíz del suroeste, barrenadores merodeadores, chinches apostonas, orugas tejedoras	No aplique una cantidad mayor que la recomendada (204 gramos [0.45 lb] de la/A) en una temporada de cultivo. No aplique dentro de las 24 horas de la cosecha.	2.13	16

continuar